

Twister

Twister er en middel tidlig sort, med godt udbytte og god robusthed ved optagning. Sorten er oplagt i økologien såvel som konventionelt pga. den supergode **skimmelresistens**.

Twister har et flot skind, en fin gul kød farve, en rigtig god smag samt gode kogeegenskaber.



Knoldbeskrivelse

| | |
|------------|-------------------------------|
| Anvendelse | Middel tidlig spise - økologi |
| Form | Rund oval |
| Skindfarve | Gul |
| Kødfarve | Gul |
| Størrelse | Mellem |
| Antal | Middel |

Resistenser

| | |
|-----------------|-----------|
| Virus | God |
| Nematoder | RO 1,4 |
| Skurv | Middel |
| Top - skimmel | Resistent |
| Knold - skimmel | Resistent |
| Rust | god |

Dyrkningsvejledning

Vigtigt

Pga. den svage modtagelighed for stødmærker og gode lageregnethed er Twister egnet til både direkte levering og lagring.

Twister har en helt unik skimmelresistens, både i top og knolde.

Generelt

Twister er en middel tidlig sort, meget gulkødet med flot skind og yderst velsmagende. Sorten er lager egnet og robust over for stødmærker. Det betyder at anvendelsesperioden er lang både efterår og vinter.

Gødskning

Gødningsniveauet er ca. 10% over standardtildeling til alm. spisekartofler i N. P og K er som standard.

Høst

Twister er normalt klar til optagning 3 uger efter nedvisning. Og er mere robust over for stødmærker, end de fleste andre sorter i gruppen med flot skind.

Sygdomme

Twisters resistenser er generelt gode. Den er **helt i særklasse når det gælder skimmel**. Resistensen mht. virus og rust er god, medens resistensen overfor skurv er middel til god.

Plantetal

Twister er meget ensartet i knoldstørrelse og for at optimere dem egenskab, skal plante afstanden ikke være mere end 22-25 cm, hvilket svarer til 55.000-60.000 planter/ha.

For yderlig information kontakt:

Niels Jørgen Kristensen - AKV Langholt AmbA
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov - www.akv-langholt.dk
Tlf.: 96 38 94 20 - Mobil: 40 15 62 33 - E-mail: njk@akv.dk